

PANNONICO- MYSICUS,

Observationibus

GEOGRAPHICIS, ASTRONOMICIS,
HYDROGRAPHICIS, HISTORICIS,
PHYSICIS

PERLUSRATUS

Et in sex Tomos digestus

AB ALOYSIO FERD. COM. MARSILI

Socio Regiarum Societatum Parisiensis, Londinensis, Monspeliensis.

TOMUS QUINTUS.



Поклон
ЈОЦЕ ВУЈИЋА из Сења
УНИВЕРСИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
У БЕОГРАДУ

HAGÆ COMITUM, Apud P. GOSSE, R. CHR. ALBERTS, P. DE HONDT.
AMSTELODAMI, Apud HERM. UYTWERF & FRANç. CHANGUION.

M. D. C. C. XXVI.

Библиотека
ЈОЦЕ ВУЈИЋА
у Сењи

T O M U S V.

D E

A V I B U S

C I R C A A Q U A S

D A N U B I I

VAGANTIBUS , ET DE IPSARUM

N I D I S.



PRÆFATIO.



Uum provida Natura præ cæteris Avium genus tantâ felicitate beaverit, ut alis suis nubes transcendere, pedibusque ad natandum aptis Undas secare, atque Terram perambulare queant; nobilitas, ac fors earum ex cunctis animantibus excellentior quoque multò habenda est: adeò ut ab illis invidenda aliquatenus ipsæ videantur. Quamvis non omnes æquè hujusmodi simul qualitatibus gaudeant, Alas enim omnes expandere; natare verò in Aquis, aut bene progredi in Terrâ, aliquæ saltem possunt. Et qui Naturæ hoc genus aërium rimari, ac specialem de iis Historiam condere sibi præfixerunt, communiter inter se ita distinguere consueverunt, ut aliquas earum aquaticas, reliquas verò terrestres nominibus suis insigniverint. Nos postquam rei nostræ esse volumus, de Aquaticis solis, in Operis hujus parte commemorare, circa Danubium, & Tibiscum, magno numero, & diversis generibus existentibus: ideo & limites non transgrediemur, ac has saltem producemus, quas institutæ semel ordo Historiæ a nobis exigit.

Quamvis autem major pars earum, Auctorum Libris jam extet, nonnullæ tamen quoque sunt, quas alibi litteris consignatas, aut Figuris expressas dari haud credamus. Has igitur, atque illas, quum arte pictoriâ, quantùm fieri potuerat, ad naturam, ac primas istarum formas genuinè exprimi curaverimus; ideo in dubio amplius non versamur, an ne potius cunctæ, vel aliquæ saltem earum in publicum sint emittendæ.

Nostri itaque propositi Aves (cum Francisco Willugbeio) distinguimus: Primò, in tales, quæ circa Aquas vagantur, illis tamen non innatant. 2º. quæ Aquas innatant; has modò dictas subdividimus in *Fissipedes-Longicrures*, & in *Palmipedes-Brevicrures*.

Ulterius quoque procedendo eas dividimus in Advenas, & Inquilinas. Advenæ nobis dicuntur, quæ tempus suum obseruant, veniendo, & discedendo. Namque tempore æquinoctiali verno a Meridie Septentrionem versùs se conducunt, ad Paludes nostras admirabili cum conventu cujusvis speciei: tempore autem æquinoc-tiali rursus recedunt ad Meridiem. Inquiline nobis sunt istæ Aves, quæ tam tempore æstivo, quam hyemali aquas istas frequentant.

Ambo verò hæc genera, cùm sint diversæ naturæ, diversos inde quoque sibi in alimenta legunt cibos; ac quælibet species specialem eundem habet quoque: vescuntur enim nonnullæ Piscibus, aliquæ herbis, luto, aut infectis aliæ, & appellamus illas Piscibus vescentes, *Piscivoras*. (Quæ ex omnibus Aquaticis gravius olent.) *Limosugas* eas, quæ e Limo, aut Terrâ pingui, & humidâ oleosum quiddam exsugunt, quo præcipue victitant; (quare Caro earum etiam tam delicata est, ut intestina ipsa esculenta fiant etiam a fæcibus non repurgata). *Insectivoras*, quæ infectis. Semina quæ legunt, vel pascuntur Herbis, *Semivoras*, *Herbivoræ*.

Sunt autem longis cruribus, eadem illæ conspicuæ, quæ Limo, aut infectis plerumque se nutriunt: *Palmipedes* verò, & *Brevirostræ*, quæ pro cibo habent herbas, folia, semina, aut Pisces.

Atque opus erit, eas cunctas (quamquam cunctas habere vix potuimus) ordine exponere, novas verò, totali quâdam descriptione cum adjectâ Figurâ noviter explicare.

De Nidificatione etiam, quæ nemini hucusque præcisè in curam venit, cùm tamen maximè necessarium, & istud quoque fuerat addidisse, seorsim quoque aliqua tradere primi aggressi sumus; siquidem Domicilia illa, seu Nidi structurâ suâ ita gratè variant, uti in Arboreos, Terreos, Natantes, *Casaritios*, Arundinaceos, Cavernales, Lutosos eos dispescere, par ratio fuerit; quia quodlibet genus, ad eum modum, qui Naturæ suæ magis convenit, hic, illuc sedes sibi solito struit. Et differunt quoque, tam quoad magnitudinem, quam formam, ac materiam, ac quia Nidis demum, ova imponunt, quæ peperere ad speciei suæ infinitam multiplicationem, quæ nec minus discrepantia invicem sunt, horumce etiam Corpora, Cor-ticem, Colorem, & cætera subjunximus, sed de his singulis, suo loco.

Hisque omnibus præmissis, ipsum opus aggrediemur Clarissimi Willugbeji vestigiis, quoad methodum omnino non tantum insistentes, sed ex ipsis, necnon cæterorum Ornithologorum monumentis descriptiunculas exhibentes singularum præfertim Avium, quæ iis notæ extiterunt, quod eò libentiùs efficiemus, quò pergratum id percommode futurum remur illis Naturæ Mystis, qui hisce nostris lucubrationibus sunt usuri. Cæterarum porrò Avium, quas apud ipsos descriptas non invenimus, & nobis tamen observare datum fuit, omni momento absolutas descriptiones, quantumcumque valebimus, tradere annitemur.

Quò verò in formâ Naturis suis convenienti, divisio earum citius spectari possit, ordinavimus hanc Tabulam.

AVIUM DANUBIALIUM ET TIBISCANARUM AQUATICAR. TABULA.

<i>Aves Aquaticæ funt, vel quæ</i>	<i>Maximæ, singulares, & sui generis, ut; Grus. Circa Aquas versantur, & in Aquosis plerumque vicinum quaerunt; Aquis tamen non innatant: hæ, vel sunt,</i>	
	<i>Picivore, ut; Ardea, Platea, Cicomia. Minores, quæ vel</i>	<i>Longissimis curvis, ut; Falcinellus. rectis, ut; Scolopax, Gallinago.</i>
<i>Filipedes, ut; Gallinulae, Fulica.</i>	<i>Longicruræ; & anomalæ, ut; Recurvi-Rostræ. Tridactylæ, i. e. tribus, in singulis pedibus, digitis præditæ, Aquis innatant;</i>	<i>Digitis omnibus, membranis intercedentibus, connexis, ut; Onocratus, Corvus Aquaticus.</i>
<i>quæ, vel</i>	<i>Palmipedes,</i>	<i>Adunco, vel</i>
<i>Cruribus bre- vioribus; quæ vel</i>	<i>Angusti-rostræ; Rostro, in ex- tremo,</i>	<i>ferrato, laevi,</i>
<i>Tetradactylæ, feu</i>	<i>Macroptera & Volatice, Lari, dicti; quorum nonnulli etiam rostrum deorum modice in- flexum obtinent, ut; Larus Cinereus, Ros- tro, & Pedibus rubris.</i>	<i>Brachyptera, & Urinatrices, Colymbi, dicti; quorum nonnulli etiam, Filipedes, sunt.</i>
<i>Digito postico soluto, atque hæ sunt, vel</i>	<i>Anserinum: quarum Notas, alibi, apud Auctores, vide.</i>	<i>Acuto, & rec- tiore,</i>
<i>Lati-rostræ; qua- dividi possunt, in Genus</i>	<i>Marinae, & Urinatrices;</i>	<i>Anatinum.</i>
	<i>Aves autem, hujus generis, sunt, vel</i>	<i>Aves autem, hujus generis, sunt, vel</i>
		<i>Fluviales, &, Lacustres.</i>

AVIUM AQUATICARUM
CIRCA
DANUBIUM
ET
TIBISCUM
FREQUENTIUM
CLASSES.

Tom. V.

C

CLAS-



CLAS S I S . I.

ALITES AQUATICI,
FISSIPEDES,
MAXIMI SINGULARES,
GENE R I S.

ET SUI

FIG U R A L.

GRUS, ΓΕΡΑΝΟΣ Græcis.



Uic Avi Corpus grande (collum eidem longissimum esse, notius est, quām ut scribi debeat.) Crura longissima. Tibiæ nigræ. Ra-
ra, & præcipuè notabilis, immo admiratione digna est, asperæ
arteriæ conformatio, foramine nempè ad id excavato, sternon
profundè ingreditur, inibique aliquoties reflexa eodem iterum
foramine egreditur, & ad Pulmones tendit: Carnis sapor de-
licatus, & ventriculus musculosus, Avem hanc minimè *Piscivoram* esse arguunt,
sed omninò *Granivoram*, aut *Herbivoram*.

GRUES ab ARDEIS, differunt primò ungue medii digiti, minimè ferrato: 2°. Magnitudine, quâ illas superant: 3°. Rostro breviore: 4°. Ventriculo musculofo: 5°. Appendicibus, seu Intestinis, cæcis, binis: cùm Ardeæ singulas habeant: 6°. Mirâ asperæ arteriæ revolutione.

Cujus accuratam, fusamque Descriptionem cum omnibus suis numeris legere poteris ex Ornithologiâ WILLUGBEI, ipsiusque Lib. III. Part. primâ, Sect. primâ, Cap. primo, §. primo, pag. 200.

CLASSES II.

AVES AQUATICÆ
FISSIPEDES PISCIVORÆ.

I.

DE ARDEIS.

EX WILLUGB. ET JONSTONIO.



Uic Avis generi sunt colla longissima, rostra quoque longa, valida in acutum desinentia ad pisces faciendos, & sub aquis latitantes extrahendos. Crura perlonga, ut aquas altius ingrediantur: digiti tandem, præfertim posticus, longissimi, ut in Fluvii firmius stare possint. Ungues satis grandes, & adunci, medio ab interiori latere ferrato ad anguillas aliaque lubrica firmius retinenda, vel quia etiam arboribus insident. Corpus plerumque macilentum & strigosum ob pavorem, & solicitudinem continuam.

Ardearum autem Familia hâc certissimâ notâ ab aliis omnibus Avium generibus distinguitur, quod nimirum intestinum cæcum unicum, & simplex singulæ obtineant, quadrupedum more, cùm aliæ Aves gemina noctæ sint.

FIGURA I.

ARDEA
CINEREA MAJOR.
EX JONSTONIO.

HÆc Ardeæ species majorcinerea, quæ est Aristoteli Pella, seu pulla, & fusca, rostrum habet longum propè frontem crassum, quod ita tenuë pedetentim evadit, ut tandem velut in acum aliquam magnam desinat. Capiti cinereus cirrus ex tenebris pennis insidet, quia syncipite incipiens sursum supra oculos per verticem erigitur. Digitus posticus longiusculus est, & ferè anticus longitudine æqualis.

FIGURA II

A R D E A
 C I N E R E A
 M I N O R.
 E X W I L L U G B.

HUic Avi, quæ Nycticorax a Gefnero non tantum, sed apud Germanorum vulgus appellatur, eo quia internoctu clamat voce absonâ, & tanquam vomitrientis, collum est præcedenti multò minus, & brevius. Dorsum ei, & vertex nigra, collum cinereum. Gula, & venter lutescunt. Ab oculis ad rostrum linea alba extenditur. Ab occipite crista, plumæ seu cirri quinque digitos longi, dependent. Alæ, & cauda cinerea. Rostrum nigrum. Pedes ex flavo virescunt.

FIGURA III.

A R D E A
 A L B A
 M A J O R.
 EX WILLUGBEJO.

Albardeola Gesneri quoque hæc Avis dicitur, uti apud Venetos *Garza*, & *Airon bianco* vocitatur, hæc Avis, quæ colore undique candidissimo, & planè niveo donatur. Pennarum remigum numerus ipsi est circa 27. caudæ 12. Mensura caudæ digitorum $6\frac{1}{2}$ crista caret. Rostrum, ut in Ardeis Cinereis, ex croceo flavicans. Palpebrarum tarsi, & spatium nudum, oculos & rostrum interjacens, viridia. Oculorum irides pallidè flavescent. Tibiæ supra articulos aliquoufque nudæ. Pedes, & unguis nigricant. Extimus digitus medio ab exortu ad primum usque articulum, membranâ adnexus. Unguis medii ab interioris Lateris margine dentatus. Sterni figura arcuata, ut in aliis Ardeis. Dorsi vertebræ sex aut septem. Colli vertebræ ad quartam deorsum flectuntur, deinde omnes sursum.

Cystis fellea magna: in furculâ appendix triangularis. Ex pinguedine Oleum conficitur adversùs flatus, ac alios morbos.

FIGURA IV.

A R D E A
 A L B A
 M I N O R.
 EX WIL LUG BE JO.

Eadem est hæc Ardeæ species, ac *Ardea alba minor* sive *Garzetta* Gesneri, & *Leucordios* Aldrovandi. A majore verò differt, quod longè minor sit, quodque cristam habeat, quâ illa caret. Coloris est undique toto corpore candidissimi veluti major. Ab occipite crista dependet. Ad oculos spatium nudum viride, rostrum $4\frac{1}{2}$ digitos longum nigricat. Oculorum irides pallidè luteæ. Lingua brevis. Pedes virescunt, sed interdum cortice nigricante obducuntur, qui desquamari potest. Tibiæ supra articulos aliquousque nudæ, & altius quam in priore. Extimus digitus medio ab exortu ad primum usque articulum, membranâ intercedente connectitur. Medii unguis pariter denticulatus ut in aliis. Appendix intestinorum ut in reliquis unica. Cystis fellea magna.

FIGURA V.

A R D E A
 S T E L L A R I S
 W I L L U G B E I.
 EX WILLUGB.

STellaris Ardea quæ est Taurus Plinii, Butorius & Botarius recentioribus, & Ocnus Aristotelis Ardeæ cinereæ magnitudine non multum cedit. Caput habet parvum, angustum seu compressum ad latera. Vertex niger ipsi est; ad angulos oris macula utrinque nigra. Gulæ, & Colli latera ruffescunt, lineolis angustis transversis nigris. Collum prælongis pennis vestitum & brevius & majus multò videtur quām re verā est. Longiores ad pectus plumæ mediis nigræ. Femora parte interiore & infimus venter ex albo pallidè ruffescunt. Exteriore parte femora etiam maculis nigris varia. Dorsum varium ex pallidè ruffo seu xerampelino & nigro (admixto quoque cinereo) maculis, & lituris nigris majoribus, quām in reliquo corpore. Fundi pennarum gulæ albi.

FIGURA VI.

A R D E A
 S T E L L A R I S
 T E R T I U M G E N U S .

EX ALDROVANDO.

AVis hæc undique sibi concolor est, nempe subruffa, pronè minùs, supinè magis. Rostrum habet palmi longitudine, coloris crocei, rectum, acutum. Superior mandibula parumper adunca est in fine, & inferiori longior cum aliquâ nigredine. Vertex ipsi est niger, collum ferrugineum duos palmos longum. In dorso nigricat, & in caudâ, cuius infimum Uropygium album: est autem brevissima. Alæ partim ferrugineæ partim albæ. Crura dodrantem unum explent. Oculorum iris lutea est.

FIGURA VII

A R D E A
C I N E R E A
F L A V E S C E N S.
N O V A S P E C I E S.

Nobis obvia venit species Ardearum isthæc, nova: cuius in Willugb. parem non invenimus, aut similem, quoad constitutionem, seu formationem corporis. Quadrat quidem hæc Avis cum Ardeâ cinereâ majore, præcedente; colore autem maximè diversa est: nullam enim, primò, habet Cristam; & gaudet capite deinceps, & Rostro longiori, & crassiori; ac inferior pars Rostri cum basi superiori, flavescit. Oculos habet grandes, iridibus magnis: collum cinereum, lineolisque nigricantibus notatum, ac inferius maculis, sive Pennulis fuscè-flavis egregiè aspersum; quæ per totum Pectus excurrunt. Venter imus, cinerascit; magis tamen in fine, seu circa principium caudæ pallescit; quæ cauda supernè rubrè-fusca est, ut & dorsum. Remiges alarum fuscescunt, seu potius nigrescunt. Scapulare tergus vestitum est pennulis fusco-flavis. Femora cinerea sunt: Pedes verò, quoad colorem murei, & aliquatenus fusti. Cætera concordat cum illâ alterâ; quam confer.

FIGURA VIII.

A R D E A
 V I R I D E -
 F L A V E S C E N S.
 N O V A S P E C I E S.

EST hæc species Ardearum non solum colore, sed & naturâ Corporis discrepans a cæteris. Rostrum enim non excurrit 3. Digitorum mensuram; supernè obscurè-fuscum; infernè verò, flavum. Oculi sunt nigri, iridibus albis. Mentum, & aliqua pars Colli albent. Vertex, cum reliquo Collo, Pectore, ac Ventre flavescit; fuscis Lineolis traductus. Dorsum magis etiam fuscescit, & ipsæ Alæ, paulò magis quoque flavefiunt; quibus tamen aliquæ Lineolæ fuscae inspersæ sunt. Cauda nimis brevis est, & formatur Pennulis albicantibus, & quasi pilosis. Femora, 4. digitos longa sunt; & vestiuntur pennis fusce-albicantibus. Pedes autem planè fusi, ac digitii pronè flavescant.

FIGURA IX.

A R D E A
F U S C A
N O V A S P E C I E S .

Corpore hæc crassior est præcedente, & a vertice ad extremitatem usque uno eodemque colore Pennæ notatae sunt. Constant enim fuscis nigris flavican-tibus Lineolis, mixtim positis: sed tamen Gula, & Pectus albescunt. Rostrum supernè fuscum; infernè autem flavum: pedes sunt murei, ac Lineolis quibusdam atratis notati. Digitæ, aliquatenus flavescent: Pennæ de cætero, quasi pilosæ ap-parent.

II.

CICONIA

EX WILLUGB.

NON multum abludit ab Ardeis Ciconia; huic tamen Collum brevius, & crassius quam illis est. Caput, Collum, & pars anterior alba, Vropygium & alarum externa facies nigra. Venter albus; Pennae alarum remiges nigrae: cauda alba; Rostrum longum, rubescens, Ardeæ Rostro simile: Pedes longi, rubentes, ad genua ferè seu secundum articulum nudi. Digiⁱ ab exortu ad primam usque juncturam membranâ connectuntur. Colli vertebræ 14. Ungues habet latos, humanis similes, quales ibidi Ægyptiacæ albæ tribuit Herodotus, medius tamen minimè ferratus est.

III.

PLATEA
 SIVE
PELICANUS
 ALDROVANDI;
 LEUCORDIUS,
 SEU
ALBARDEOLA
WILLUGBEI.
 EX WILLUGBEO.

Platea avis, quæ & Plataea a Gesnero, & apud Italorum vulgus *Beccaroveglia* appellatur, coloris est per totum corpus, instar Cygni candidissimi. Ultra oculos rostrum versus nec plumas nec lanuginem habet, ut in Ardeis & Corvo Marino. Angulus porrò mandibulæ inferioris nudus ipfi est, quod fortè in hac Ave singulare est.

Pennarum alæ Remigum prima nigricat. Secundæ pinnulæ tantum ad scapum exteriores, seu exterior a scapo medietas, & interioris apex. Tertiæ apex tantum. Quarta adhuc minus nigricat. Eodem modo & in secundo ordine tegetes inferiores apicibus, & scapis nigræ; cauda perbrevis.

Rostrum figuræ singularis & insolitæ; planum, & depresso prope extremitatem in circularem ferè figuram dilatum ad similitudinem Cochlearis, unde & Avis ipsa Cochlearia a Belgis dicitur.

CLASSIS III.
AVES AQUATICÆ
LIMOSUGÆ,
ROSTRIS TENUIBUS LONGISSIMIS RECTIS.

I.

FIGURA I.

GALLINAGO
CINEREA
M A J O R.
M A S.



On solum Corpore major, sed & magis dissimilior est speciebus cæteris. A base Rostrum autem ad finem usque Caudæ, colore mureo, per Pectus, Collum, ac Caput quoque, Pennulae insuper luteæ, aliae sunt immixtæ. Scapulares Alarum Pennæ fuscescunt: per totas verò Alas, Mureæ Pennæ, cum fuscis, pulcherrimè alternant. Remiges planè colore fusco tinguntur, exceptis molliculis quibusdam Plumis, quæ eas tegunt, albantibus. Femora, Pennulis Mureis vestiuntur: cum Pedibus, & illorum digitis, magis in hac, quam in alterâ specie fuscescentibus. Oculi, iridibus albis, nigrescunt. Rostrum 7. digitos longum, in fine nigrescit, in basi verò, ex fusco flavescit.

Tom. V.

P

FIGU-

FIGURA II.

GALLINAGO
C I N E R E A
M A J O R.
F O E M I N A.

PRiori non multùm absimilis est excepto hoc, quòd Caput, Collum, ac Pectus, Pennulis fuscè-undantibus, sint inspersa; Pedes, & illorum digiti, ceu Plumbum, magis livescant; Circellis compluribus, nigricantibus, hic, illic cingentibus.

FIGURA III

GALLINAGO VULGARIS MINOR.

AD formam reliquarum Gallinaginum est facta, & per totum Corpus, æquater colorata: Maculis enim fuscis, nigris, albicantibus, ac mureis, cernitur: Pedibus nigris. Alioquin tota ipsius magnitudo, Merulam, haud superat; ac Rostrum in longitudine 4. digitorum protenditur.

II.

FIGURA I.

B A R G E

S E U

ÆGOCEPHALUS
BELLONII,
FEDOA GESNERI,
RUSTICULA ALDROVANDI,
SCOLOPACE MAJOR.

HUic Avi caput est ex ruffo-cinereum mediis plumarum nigris. Supra oculos albet. Collum, & Gula rufescunt. Pectus fordidè albet. Dorsum ruffo, nigro, & albo varium est, mediis pennularum nigris, fimbriis ex albo rufis. Mari gula, & pectus lineis transversis nigris depicta; Feminæ gula, & collum cinerescunt. Uropygium totum ferè album maculis nigricantibus aspersum.

Remiges alarum majores nigræ scapis albis. Reliquæ uti & secundi ordinis pennae apicibus, & fimbriis ex ruffo cinerescunt. Minores Alarum tegetes corpori concolores.

Rostrum ad basim albicat, versus extremitatem nigrum est, pro avis magnitudine etiam Gallinaginis rostro longius.


CLASSIS IV.

AVES AQUATICÆ
L I M O S U G Æ,
 ROSTRIS TENUIBUS LONGISSIMIS CURVIS.

I.

FIGURA I.

N U M E N I U S
 ALDROVANDI
 SIVE
A R C U A T A.
 EX JONSTONIO.



Rquatum ab Arcuato rostro sic dictam, Numenium veterem qui fortè à Neomeniâ, quòd Rostri figura arcum Lunæ recens à novilunio crescentis in cornua repræsentet, ita dicitur esse Gefnerus credit; Bellonius Elorium Aristotelis conjicit. Rostrum habet circiter octo digitos longum post tres digitos fleti deorsum incipiens, nigrum. Pennas coloris fusci varias, & quibus maximè fulgent instar ferici villoſi, quæ inter alas, & dorsum sunt, in medio nigrae, in circuitu per interſtitia subruffæ. Digiſi ſunt fiffi, ſed aliquatenus membranâ conjuncti; quæ etiam utrinque juxta digitos descendit, & inferiorem di- giti partem dilatat. Lingua pro tantâ rostri longitudine breviffima eft, & fagittæ effigiem repræſentat. Femina eft aliquando minor, & maculae illæ, quibus to- tum corpus reſpergitur, in hâc magis fuſceſcunt. Omnia verium genere vefci- tur, eosque in plantis quibusque quærifit. Turmatim volant, ova pariunt quanta Gallinæ, quaterna pallida, mense Aprili Carnem habent ſiccām, ſolidam, Lepo- rinæ ſimilem.

Tom. V.

T

FIGU-

FIGURA IL

A R C U A T A
M I N O R.
P U N I C E O C O L O R E ,
PECTORE VIRESCENTE ,

IN omnibus Arquata minor cum prædescriptâ convenit præterquam in magnitudine, & plumarum colore; hæc enim præcedente satis minor est, puniceisque plumis, per totum ferme corpus, si pectus excipias, quod eleganti viridi colore insignitum conspicitur, donatur.

II.

FIGURA I.

FALCINELLUS
 G E S N E R I,
 ET
 A L D R O V A N D I,
 C O L O R E F U R V O.

FAlcinelli nomine insignitur hæc Avis, quòd arcūs aut Falcis speciem rostro imitetur. Corpus ipsi est ad Ardearum magnitudinem accedens, eleganti colore viridi ferè, alicubi etiam puniceo admixto, ut in Vanello ave, variante scilicet colore pro diversâ ad lucem obversione, capite & collo fusco, sed superior pars colli anteriùs albicat maculis nigris intervenientibus; rostrum oblongum, tenuē, & anteriùs Falcatum, sicut Arquatæ, & Corvo nigro sylvatico. Crura oblonga, pedes fissi. Aliqui Ardeam nigram Italicè *Ayron negro* vocant. In colore per ætatem hæc Avis aliquid mutare perhibetur. Hactenus Gesnerus. Hinc nil mirum si hæc a nobis circa Danubium observata per totum ferme corpus, potius furvo, quam præfatis coloribus prædicta existat.

FIGURA IL

FALCINELLUS
PUNICEO
VIRIDI S;
ARDEÆ SPECIE.

Statura propemodum quadrat, cum præcedenti. Color tamen differt quam maximè; namque corpus undique obscurè-Puniceo colore relucet; & maculis virescentibus conspersum est. Collum, venter, femora cum caudâ, pillosis quasi Plumulis consita: ac Humerales Alarum partes circumdant, Pennulae virescentes. Oculi Iridibus albis nigrescunt. Pedes cum suis digitis, cinerei, splendentes: de cætero verò toto corpore aliquatenus habitior appetit præ istâ.

C L A S S I S V.
 A V E S
A Q U A T I C Æ
 N O N
P I S C I V O R Æ
 R O S T R I S T E N U I B U S , M E D I Æ L O N G I T U D I N I S .

I.

FIGURA I.

HIMANTOPUS

P L I N I I.



Imantopus, quæ a flexilitate crurum ita dicitur, rostrum digitos ferè quatuor longum habet, Caput parvum, collum digitorum quinque, reliquum corpus, quod leve, & gracile est, instar Avium palustrium ferè, quas Gallinulas Aquaticas vocamus, digitorum sex, caudam quatuor, crura quindecim. Color rostri nigricat, in Capite, & collo prono fuscus. Dorso, & Alis Niger, parvo subviridi admixto, si diligentius intueris, cauda cinerea. Partes pronè omnes, & latera quoque albi coloris sunt. Crura sanguinea digitis dumtaxat ternis, sicuti aliquibus aliis Avibus observatur, quorum medius longiusculus, brevissimus interior. Jungitur autem medius cum exteriore brevissimâ membranulâ, tanquam palmi pedum. Poplitum cavitas insignis est, articulo tam flexili, ut in sceleto etiam tibia ad femur tota reflectatur. Videtur sanè non cursu tantùm valere, sed etiam volatu hæc Avis: quoniam oblongæ ejus Alæ sunt ita ut longissimæ earum pennæ caudam, seu uropygium, duobus aut amplius digitis excedant.

II.

FIGURA I.

PLUVIALIS
M A J O R
ALDROVANDO,
GLOTTIS , BALTNERO,
VENETIS TOTANO.

EX WILLUGBEJO.

HUic Avi rostrum est nigrum, ad angulum tamen mandibulæ inferioris rubrum, tenue ab apice ad angulos oris $2\frac{1}{2}$ digitos longum. Color in supernâ parte capitis, colli, alarum, & scapularum, dorsi anterioris varius ex fusco, & cinereo seu albido. Summi Capitis plumarum oræ extremæ albent, mediæ nigrefcunt. Prona pars tota albet, ut & infimum dorsum seu Uropygium. Pennæ alarum 26. fuscæ omnes; quinque exterioribus obscuriores, pinnulis interioribus punctulis albentibus conspersis; interiores pallidiores, guttulis albis maculosæ. Cauda 3. plus digitos longa, 12. pennis composita, transversis lineis, seu spaciis fuscis, albis externis undulatis varia. Crura longissima, supra primum articulum ad duos usque digitos plumis destituta. Color, inter viridem, & lividum, seu plumbeum medius. Posticus digitus parvus: ungues nigri. Extimus digitus medio ad sui exortum adnexus.

III.

FIGURA L

GALLINULA
CRYTHROPOUS
MAJOR GESNERI.
EX WILLUGBEO.

Magnitudine est inter Vanellum, & Gallinaginem minorem mediâ, ad Pluvialem ascendens. Caput, & dorsum ex fusco cinerea, nigro maculata. Colli medium magis cinereum. Gula albo, & nigro varia maculis, seu lituris nigris, secundum longitudinem pennularum productis. Albus autem color nonnihil rufi admixtum habere videtur. Pectus magis album, rarioribus maculis, iisque transversis. Cauda, & pennæ Caudæ proximæ lineis albis & nigris alternis cymatili ductu variæ. Rostrum duos digitos longum tenue Scolopacis rostro simile, ad basim obscurè rubrum summâ parte nigrum. Lingua acuta tenuis non divisa. Mandibulum superius longius, in ipsâ extremitate nonnihil incurvatum. Oculorum Irides avellaneæ: Nares longæ. Pedes pulchrè rubent, unguibus exiguis nigris. Digitus posticus perexiguus ungue pusillo. Anticorum intimus minimus. Omnes inferius membranâ connexi, extimus autem latiore, & quæ ad secundum usque articulum extenditur.

IV.

FIGURA I.

A V I S
 P U G N A X.
 E X J O N S T O N O.

Pugnacis nomine hæc Avis a cæteris distinguitur eo, quia inter mares interdum tanta contentio fiat, ut continuò pugnant, & se se mutuò occidant, donec cum fæminis numero pares evaserint.

Ruffo plerumque donatur colore hæc Avis; Ventrem verò fuscum habet, ut & podicem albicanem, alasque subalbicantes maculis multis magnis transversalibus tortuosis distinctas. Caput ipsi nigrum est, at magis pennis candidis in extremitatibus nigris, veluti galeâ, quas dimicatura erigit, exornatur, ut ex ictone observari licet.

C L A S S I S VI.

A V E S

A Q U A T I C Æ,

ROSTRIS BREVIBUS INSECTIVORÆ.


F I G U R A I.

P L U V I A L I S

V I R I D I S

S E U

P A R D A L I S.



Æc Avis quæ apud Italorum vulgus *Piviero* vocitatur, magnitudine Vanellum æquat superatve. Color in vertice, cer-
vice, scapulis, dorso & in universum supinâ parte totâ niger,
maculis luteo-viridibus crebris variè respersus. Singulas plu-
mulas, si consideras, media cujuscunque pars nigriscat, oræ,
seu margines maculis circumcirca luteo viridibus pinguntur.

Caput prô corporis mole quam in Tringis grandius. Rostrum rectum, nigrum longi-
tudine digitali, circa nares sulcatum: collum breviusculum, & Vanelli par. Venter,
albus laterales tamen pennæ non apicibus solum sed & lineis transversalibus variegantur.

Digito postico caret, quam notâ sola a reliquis hujus generis, fatis distinguatur;
fides hinc non fit ab illâ præsenti figurâ nostrâ: ac quoniam in alio genere, quæren-
dus haud erit, pro nothâ illius pluvialis viridis specie omnino haberri necesse est.

FIGURA II.

PLUVIALIS
C I N E R E A
S Q U A T A R O L A
V E N E T I I S D I C T A .
E X W I L L U G B E J O .

CApus, dorsum, tegetes alarum minores nigræ apicibus plumarum ex cinereo viridibus. Mentum album, Gula lineolis seu maculis oblongis, fuscis distinguitur; Pectus, Venter, femora alba.

Pennæ alarum remiges 26., quarum primæ seu extimæ nigricant: quarta exterioris limbi mediâ parte albet, albore in quinque sequentibus paulatim acuto. Secundo pennarum ordine extimæ itidem nigræ; post quartam sequentium apices albent, & a decimâ etiam fimbriæ. Tertiī ordinis anteriores decem nigræ, apicibus albis. Cauda tres digitos longa, non forcipata, areis seu spatiis transversis albis, & nigris varia.

Rostrum nigrum, plus digitum longum, hujus generis reliquorum simile. Lingua non divisa. Pedes fordidè virescunt, unguis parvi, nigri. Posticus digitus valde exiguis. Antici divaricationis initio membranâ copulati; intimus minore.

Vesiculam-Felleam obtinet. Hujus quoque caro laudatissima, & delicatissima.

FIGURA III.

PLUVIALIS
F L A V O -
V I R E S C E N S.
M A S.

CRURIBUS fôrdidè-virentibus in unâ; in alterâ ex Plumbo viridibus. Quum in istarum Avium nonnullis, ut observavit Leonardus Baltner, Auceps Argentoratenfis, Sexus, Colore Pedum, differant.

FIGURA IV.

PLUVIALIS

F L A V O-

V I R E S C E N S.

F O E M I N A.

CRURIBUS folidè-virentibus, in unâ; in alterâ, ex Plumbo viridibus. Quum
in istarum Avium nonnullis, ut observavit Leonardus Baltner, Auceps Ar-
gentoratensis, Sexus, Colore pedum, differant.

FIGURA V.

PLUVIALIS
F U S C O -
C I N E R E A
R A R I O R S P E C I E S .

Color eam maximè a cæteris distinguit, fuscus, Collum, Tergus ac Alarum scapulares oræ, atris scutulis ubertim sunt notata. Rostrum basis superior aliquantum albicat. Pectus, ad ventrem usque, villosum atro-cinereoscentibus plumulis intectum; Remiges atrescent, Marginibus, seu oris albis. Pedes item. Quæ cuncta melius tamen ex ipsâ picturâ cognoscentur.

FIGURA VI.

PLUVIALIS
F L A V O-
C I N E R E A.

Accedit hæc Avis ad Cinereum Pluviale, maximè quoad constitutionem Corporis; attamen paulò minor est, ita ut Hirundinis vulgaris magnitudinem vix ac ne vix quidem superet. Totaque adeò Corpore magis flavescit altera, & Collo, ac Pectore, maculis pluribus obscuris est inspersa. Remiges, quæ ad Uropygium usque excurrunt, unà cum illo nigricant. Rostrum aliquanto productius est, ac in extremitate incurvum.

FIGURA VII.

PLUVIALIS
MINOR
ALAUDA
VULGARIS
MAGNITUDINE.

P Lumeo vestitu suo, Pluviale majorem, non penitus refert.

CLASSIS VII.

I.

AVES AQUIS

INNATANTES

FISSIPEDES

(QUIBUS DIGITI NULLIS AD LATERA MEMBRANIS AUGENTUR; GALLINULÆ AQUATICÆ DICTÆ)

GALLINULÆ,

VERIUS

PLUVIALES,

PLUVIARIÆ DICENDÆ ESSENT; QUOD LOCA IMBRIIBUS
MADIDA, ET PALUDES FREQUENTENT.

FIGURA I.

GALLINULA
CHLOROPUS.

RARIOR SPECIES.



Imilis est hæc Avis aliquatenus illi, quæ a Willugbejo Ornithologiæ Lib. VIII. Part. I. Sect. V. Cap. V. §. 1. Gallinula Crythropus major vocatur. Discrepat in hoc, quod Rostrum Proboscide flavescente, ita extensa insignitur, ac si ipsissima esset Gallinago. Atque Collum, Gula, Mentum, tam anterior quam posterior Capitis pars, pluribus ferrugineis, ac flavis maculis tincta videntur; Pectore, Ventre, ac Cruribus colore plumbi: Alis fordidè livescientibus, seu olivaceis. Cauda exigua, eademque villosa, quasi apparet: Pedes, virescunt. Rostrum ultra 3. digitos longum.

II.

AVES NATATRICES
F I S S I P E D E S
 DIGITIS AD LATERA MEMBRANIS AUCTIS
GALLINULIS AFFINES.

FIGURA I.

F U L I C A
E X W I L L U G B E J O.

ROstrum huic Avi est Sesquipedale (non verò ex ceruleo album, sed quasi roseo colore, seu carneum) acutum parum compressum: Mandibulæ æquales. Pedes cærulei seu ex fusco virides. Posticus digitus parvus, cui unica membrana adhæret; non semicircularis, sed per totam longitudinem extensa: Anticorum intimus extimo paulò brevior: omnes autem digitii longiores, quam palmipes. Ad Articulos digitorum membranæ semicirculares appensæ, prætensæve sunt; intimo digito duæ, medio tres, extimo quatuor. Ab interiore digitorum parte membranæ circulares majores sunt, & magis distinctæ, adeo ut anguli seu crenæ intermediae ad ipsos usque articulos penetrant. A rostro ad verticem ferè a surgit excrescentia, seu globus carneus, mollis, glaber, rotundus, nudus, quem calvitiem vocant. Plumæ circa collum, & caput humiles, molles, & densæ. Color ubique niger, intensius circa caput. Pectus, & venter plumbea. Pedes ad articulos genuum creditos, ferè plumis tecti, supra articulos, ubi plumæ incipiunt, circulus lutescens. Primæ decem remiges, ex fusco nigrae; proximæ octo dilutiores, apicibus albis. Ultimæ intensius nigricant. Cauda 12. pennis constat; duos digitos longa.

Hepar magnum in duos lobos divisum cum cysti felleâ pariter grandi. Appendices intestinorum, seu intestina cæca, novem digitos longa, extremitatibus ad digiti intervallum reduplicatis; nidum ex Gramine, Arundinibus &c. construit, inter arundines in summis Aquis fluitantem, ut una cum aquâ attollatur, & subsistat, eumque arundines fistunt, ne cum flumine devehatur. Rariùs arboribus infidet.

Figura ut toto corporis habitu Gallinulas refert, ad quarum genus procul dubio pertinet.

III.

A V E S

P A L M I P E D E S

L O N G I C R U R A E A N O M A L A E

F I G U R A I.

R E C U R V I

R O S T R A.

E X J O N S T O N O.

HÆc Avis, quæ apud Italos *Avosetta*, *Spinzago d'Aqua* & *Bevostorta* dicitur, magnitudine columbae, aut paulò gracilior est, rostro nigro sursum tendente in extremo acuto quinque digitorum ferè longitudine. Corpore supino toto albo, capite, & cervice superius ex fusco nigricante, pedibus coloris cyanei diluti, digitis membranis junctis. Cruribus longis, ac ideo posteriore digito, qui pro calce est minuto. Vox ipsius est *Crex, Crex.*

CLASSIS VIII.

AVES PALMIPEDES
TETRADACTYLÆQUIBUS DIGITI OMNES MEMBRANIS INTER-
CURRENTIBUS CONNEXI SUNT.

FIGURA I.

ONOCROTALUS,
SIVE
PELECANUS,
ALDROV. WILLUGB. p. 246.
EX WILLUGBEJO.

Uic Avi quæ ab Aldrovando censetur Aristotelis Pelecanus, Onocrotali nomen impositum fuit, quòd edat vocem rudenti Afino persimilem. Apud Italos vulgò dicitur *Grotto*, e *Molinaro*. Ipsí color totius Corporis est albus: Collum tamen flavicat. Dorsalium pennarum scapi nigrificant. Caudæ & alarum tegetes ex fusco cinerascunt, ut in Anseribus. Extremæ remiges nigræ. Rostrum versùs caput coloris plumbei, extremitate flavicante. Mandibula superior lata depressa; Inferior duæ longæ costæ, alterâ extremitate junctæ intercedente membranâ crassâ seu cute luteâ quæ ad gulam etiam ultra rostrum extenditur. Ad extremum rostri tuberculum extat; ultimus verò ejus apex incurvatus est, & aduncus: Nares ad supremam rostri partem juxta plumas capitum supra rimam seu canalem rostri, quæ etiam in Anfere Bassano cernitur sitæ, rotundæ. Oculorum irides ex cinereo flavicant, seu potius albicant. Pedes plumbei. Tibiæ supra articulos genuum vulgò, sed falsò dictæ, nudæ. Digitæ quatuor intercedentibus membranis unâ juncti.

Ingluvie eâ parte, quâ capiti adhæsit colligata, ad aquam ejiciendam Piscatores uti solent: quia humiditate corrupti nequit, multo tempore utilis est.

FIGURA II.

CORVUS AQUATICUS.

EX WILLUGBEO.

Magnitudine ad Anserem accedit. Color in supinâ parte fuscus, cum quâdam obscuri viroris tincturâ splendens, & omnino qualis Graculi palmipedis. Pectus, & Venter albicant. Remiges pennæ in singulis alis triginta aut circiter, quarum apices extremi, & ut secundi ordinis cinerascunt nonnihil. Cauda palmum & dimidium longa ultra pedes extenditur, extremâ circumscriptione, cum expanditur, subrotunda, interius concava. Rostrum quale Graculis palmipedibus extremo aduncum. Mandibula superior nigra marginibus auctis: Mandibulæ inferioris margines compressi, lati. Lingua exigua & ferè nulla. Oculi proprius ad aperturam oris siti sunt, quam in aliis plerisque Avibus, iridibus cinereis. Crura valida, brevissima, crassa, lata, & compressa, saltem in junioribus. Pedes, & unguis nigri, cute tecti in squamas non integras, sed cancellatas divisa. Digi quatuor omnes antici, latâ, & nigrâ membranâ simul juncti. Extimus longissimus est, reliqui ordine breviores. Medii unguis parte interiore ferratus est.

CLASSIS IX.
 A V E S
 R O S T R O A N G U S T O
 IN EXTREMO ADUNCO SERRATO MERSI DICTÆ.

MERGANSER

E X W I L L U G B E J O.



Igura corporis oblonga est. Dorsum latum & planum. Caput cum superiore Colli parte ex viridi seu cœruleo splendente nigricat: inferior colli medietas alba est cum aliquo splendore. Superior tamen infimi Colli pars, dorsum medium, nec non scapulares pennæ interiores nigræ, (exteriores albæ sunt.) Dorsum inferius delicate cinerascit. Utrinque juxta uropygium, inque suo uropygio & femoribus plumæ transversis fuscis lineis veluti irrorantur. Cauda tota cinerea est.

Pennæ Alarum nigræ sunt sed apicibus albis donantur. Rostri mandibula inferior nigra est ad latera utrinque ruffa five punicea; Apice nigro adunco totum denticulis introrsum spectantibus ferratum. Lingua, & palatum flavescent.

Cirrum in capite propriè dictum non habet: plumæ tantum laxiores sunt, & surrectiores solito, unde & caput majus justo appetit. Aures rotundæ sunt; Nares amplæ; oculorum irides sanguineæ. Pedes coloris miniacei elegantis. Posticus digitus membranulâ acutus.

II.

AVES PALMIPEDES
PLATYDACTYLAE

FORTASSE RECTIUS QUAM PALMIPEDES DICENDÆ, TE-
TRADACTILÆ DIGITO POSTICO SOLUTO

ROSTRO ANGUSTO

ACUTO, IN EXTREMO NON ADUNCO BRACHYPETRÆ
ET URINATRICES, COLYMBI DICTÆ

FIGURA I.

COLYMBUS
MAJOR
CHRISTATUS.
EX ALDROVANDO.

ROstri utraque mandibula, quâ capiti conjungitur, croceo colore tingitur. Caput in vertice nigrum, inferius cinereum, qui colores prope oculorum qui flavi sunt finem conjunguntur. Ab occipitio demittuntur cirri nigri. Cervix quoque nigra: quod reliquum est in Collo inter ferrugininem, & roseum ambigit. Pectus, venterque ex cinereo alblicant: dorsum & alæ nigræ sunt, sed harum costæ, & extremitates alblicant. Cauda prorsus nulla. Uropygium ex cinereo nigricat. Crurum, pedum, & unguium eadem constitutio quæ in majori Colymbo non Christato.

FIGURA II.

COLYMBUS
 SIVE
PODICIPES
MINOR.
EX WILLUGBEJO.

COrporis figurâ Querquedulae similis est, ferè tertiam parte minor. Rostrum ab apice ad angulos oris digitale, rectum, acutum, turdino ferme simile, ad caput crassius versus apicem sensim tenuatur. Superior mandibula nigricat; Apice externo, & lateribus exceptis, quæ alblicant aut pallidè flavent; ut & tota inferior mandibula. Lingua longa, acuta ad modum rostri bifida. Nares a plumagine aliquantulum remotæ. Oculi magni iridibus avellaneis. Densâ & molli lanugine vertitur pronâ præfertim parte. Color ei in dorso fuscus aut subniger, in ventre albidus aut potius argenteus. Mentum album. Caput & Collum ventre obscuriora, dorso minus obscura. Gula, & Colli latera nonnihil rufescunt. Infimus venter fordidior & obscurè fuscus. Femora nonnihil ruffi admixtum habent. Collum tenue vix palmum longum, quo erecto quamprimum emerserit circumspicit, & mirâ celeritate se statim in aquas iterum demergit. Alæ parvæ concavæ. Caudâ prorsus caret, sed glandulis uropigii donatur, minoribus tamen, e quibus plurimum fasciculus exoritur ut in aliis Avibus. Crura in extremitate corporis sita sunt, ad natandum potius, quam ad ambulandum comparata (ita ut hæc Avis nisi erecto Corpore omnino incedere nequeat.) Pedes autem in tres digitos latos, utrinque membranis appensis acutos dividuntur: unguibus tenuibus, latis, obtusis, & humanis similibus. Ad primos tamen a divaricatione Articulos digitii membranis conjunguntur. Habet & posticum digitum parvum, utrinque pariter pinnatum.

III.

ROSTRO ANGUSTO

IN EXTREMITATE NON ADUNCO

MACROPTERÆ

ET VOLATICÆ

LARI DICTÆ.

FIGURA I.

L A R U S

C I N E R E U S

M A X I M U S

MARINARIUS PISCATOR.

E X W I L L U G B E J O.

Magnitudine ad Anatem domesticum accedit. Rostrum flavum duos digitos longum angustum. Mandibula superior nonnihil in extremo adunca, modicè incurva: Inferior non ut in aliis Avibus recta, sed margine superiore convexa, seu arcuata, inferius processu quodam seu prominentiâ angulari extuberat, ad cuius latera litura ampla, rubra, aut miniacea. Oculorum irides pulchrè flarent. Pedes in aliis lutei, supra articulos genuum vulgo creditos aliquousque implumes in aliis albi aut pallidè carnei: digitus posticus exiguus. Ungues nigri; medii interior margo acutus. Caput, Collum, uropygium, cauda, totaque insuper prona facies alba. Ingluvies ei magna, ventriculus musculosus; intus ossa piscium.

Tom. V.

T t

FIGU-

FIGURA II.

L A R U S
 C I N E R E U S
 M A J O R
 B E L L O N I I
 HIRANDO MARINA,
 VULTUR PISCARIUS.

G Y R - F A L C O M A R I N U S
 A L I Q U I B U S D I C T U S.

Ancipites diu hæsimus, Titulo Lari Cinerei, Bellonii, an Lari majoris Cinerei, Leonardi Baltneri, insigniremus Alitis hanc speciem: cum neutrâ enim horumce descriptione exactè quadrat, ab utrâque verò notabilem fanè aliquam trahit partem. Paucis me expediam. Vertex, seu, summa pars Capitis ex viridi-obscuro nigricat; Collum, Venter, atque Pectus, flave-virescunt. Alæ fuscoc-Cinereæ; & ab Angulo anteriori earum, Sulcus, seu Semita quædam ferruginei coloris, ad Tegetes usque traducta est. Remiges in extremitate pururascent. Rostrum plus digitum longum; deorsum nonnihil inflexum, seu arcuatū; præcipue versùs Apicem, qui acutus est, Colore fuso, ut Larum cinereum (Majoris hiantem) tanquam in Tabulâ, jucundè referat. Potissima ratio, quare ad Larum Cinereum (majoris titulo addito Bellonii) retulerimus; est Avis hujus, illa digitii Postici parentia; quâ ab aliis sui Generis omnibus, sibi, ac cæteris, hactenus observatis, facile dignosci, afferit Willugbei Ornithologia, Lib. III. Part. III. Membr. II. Tit. IV. Cap. II. §. 4 & 5.

FIGURA III.

**L A R U S
A L B I C A N S.**

Magnitudo hujus Avis, a summo, ad oppositam partem, 16., prope Rostrum erit digitorum 2. quod magis ad basim rubescit. Vertex, & item aliqua pars Colli, tota nigra. Collum verò, ac Pectus cum Corpore reliquo albicant, cum Tegete caudæ, quæ exigua est, & cum ipsis alis exit candicanter. Remiges atrore conspicuæ. Oculi, iridibus albis, nigri sunt. Femora vestiuntur pennulis albicantibus; Pedes rubescunt, cum suâ membranâ rubris Stigmatibus notatâ, quæ digitos connectit.

FIGURA IV.

L A R U S
 C I N E R E U S
 M I N O R.

PAr idemque omnino est, magnitudine cum illâ præcedenti specie. Rostrum tamen planè nigrum, & non excedit $1\frac{1}{2}$ digitum. Frons & Mentum albificant; punctulis quibusdam nigris inspersis: Vertex nigricat. Collum vestitur pennulis undatis cinereis; uti & pectus ac dorsum. Alæ quæ insimul caudam efformant cinereæ sunt; passim tamen pennulis fuscis conspicuæ. Femora cinericeis intecta plumis, pedes ac reliqua fuscescunt.

FIGURA V.

L A R U S
 C I N E R E U S
 F I S S I P E S
 R O S T R O,
 A C P E D I B U S
 R U F E S C E N T I B U S.

Similiter, æqualis est præcedenti magnitudine: Rostrum tamen aliquatenus longius; duos scilicet digitos excurrens habet. Gula, Pectus, Venter, & Ancones Alarum albescunt: vertex autem, collum, ac dorsum, fuscis maculis, & flavescentibus alternatim quasi positis pinguntur. Alæ item subtilibus lineolis, fuscis, mureis, ac flavescentibus resurgent. Strata verò earum albicant. Remiges alarum fuscescunt in fine exiles, ac breviusculi sunt pedes, qui cum flavo rufescunt.

FIGURA VI

L A R U S MACULATUS.

PArum habitior corpore est alterâ; colore autem, diversissima species. Rostrum $\frac{1}{2}$ digitum longum; & vertex, nigrescentibus pennulis cinctus. Inferior Capitis verò pars, cum mento, ac temporibus albis plumulis distincta. Gula subtus maculâ quadam virescenti cum toto pectore notatâ; insuperque, ac aliquanto inferius, Torque livescenti discriminata. Reliquum Corpus, modò albo, modò pullo colore variatum. Remiges alarum nigrescunt, sed nihilominus Apicibus albis gaudent; Oculi sunt nigri, iridibus albis. Femora cum pedibus sordidè flavent; magis tamen membrana digitos connectens pallescit.

HIRUNDINIS

(PROPRIE ITA DICTÆ)

RIPARIÆ SPECIES.

Non hæc illius memorandæ sedes, aut locus erat, quia inter Aves terrestres Lib. II. Part. II. Sect. II. Membr. I. Cap. III. §. 3. Ornithologiæ suæ Franciscus Willugbeius collocat; atque ibi, in eâ Clasfe meritò ponenda est: attamen, quia & circa Aquas versatur, & in Aquosis simul ac in continenti victum sibi quærit, Culicesque, ac Muscas legit (Aquis quamquām non innatet; sicuti & pleræque ex eadem specie) inque Riparum foraminibus nidificat: Ideò inter aquáticas Aves, Avis hæc utique spectabitur, ceu Anser nonnunquam inter olores.

Vulgarem Riparum Hirundinem, magnitudine multùm superat, ac quasi in duplå ratione illam nobis reddit.

CLASSIS X.

AVES PALMIPEDES
LATIROSTRÆ.

I.

ANSERINUM GENUS

FIGURA I.

CYGNUS
MANSUETUS.
EX WILLUGBEJO.

Otum corpus plumagine molli delicatâ vestitur in ætate provectioribus niveâ, junioribus Cinereâ. Pennarum alæ majorum calami in hac specie majores sunt, quàm in Cygno fero.

Rostrum in pullis, & anniculis plumbeum, rotunda apicula seu ungue in extremitate, & areola a naribus utrinque ad caput nigra. Ab Oculis ad rostrum spatium triangulare nudum nigrum, cuius basis rostrum vertex oculos spectat. Provectioribus rostrum rubescit, extremo ungue nigricantes, ad basim autem lobus carneus seu tuber grandiusculum nigrum insigne, annorum seu deorsum inflexum attollitur. Spacium sub oculis medium semper nigrum perdurat. Lingua denticulis hirta, Pedes coloris plumbi, paulo supra genua nudi; intimo digito membranâ exterius appenditur. Ungues nigricant.

CYGNUS FERUS.

Cygnus ferus in omnibus cum manfueto convenit si totius corporis rostrique longitudo excipiatur, quæ illi paulò major est; propterea hujusmodi Avis iconem exhibere supervacuaneum arbitramur.

Præterea tam, quæ ad Cygni utriusque naturam spectantia, quàm quæ observata fuere in eorumdem deflectionibus anatomicis, ut & quæ de Cygneâ cantione a recentioribus æque ac veteribus tradita fuere, plurimis argumentis, testimoniis, ac observationibus apud eundem Willugbejum videri licet.

II.

FIGURAL

A N S E R
 F E R U S
 F O E M I N A.
 EX WILLUGBEJO.

Magnitudine Anserem domesticum æquat estque figurâ corporis ei persimilis nec colore multùm abludit. Caput, collum, dorsum in universum pars supina tota exceptis caudæ proximè incumbentibus pennis, obscurè cinerea aut fusca. Alarum tamen vestitrices supremæ dilutiores sunt. Clericuli dicti, tura his proximæ tertii, & quarti ordinis pennæ itemque scapulis innatæ oris, seu marginibus summis albescunt. Pennæ etiam caudæ immediatæ niveæ. Alarum remiges 27. aut 28. obscuræ omnes & propemodum nigræ. Cauda palmum, & dimidium longa, cùm explicatur extremâ circumscriptione subrotunda, 18. pennis composita nigris cum apicibus, & marginibus exterioribus albis. Color in pronâ corporis parte albidus, sensim lucidior a capite ad caudam usque ubi prorsus niveus. Rostrum duos plus digitos longum, a capite ad medianam ferè partem nigrum, deinde Croceum apice iterum nigro. Superior mandibula secundum longitudinem dentata, pluribus denticulorum ordinibus; inferior unico tantum ordine in utrumque latus. Lingua quoque ad margines utrinque denticulorum ordinem in membranulâ adnexa obtinet. Pedes Crocei: unguis nigri aut lividi. Sub oculo utroque linea la albicans.

FIGURA II.

ANSERINUM

GENUS ALIUD.

Anser hic Corpore vel tantillūm gracilior appetet altero. Rostro autem nigro verius colore fusco tincto, notiorem se facit: quod longitudine 4. digitorum & amplitudine 1 $\frac{1}{2}$. ceu nodo quodam collectum denuo contractiori angulo profluit & in extremitate cuspidatum est, & aduncum collum mureis undique, & fuscis pennulis vestitum est. Venter verò & dorsum mutant mureum colorem in fuscum vel ipso adhuc obscuriorem, Scutulis perpluribus furvis interspersis. Scapularis angulus ceu limite quodam albicanti cingitur. Ipsumque alarum anterius plumitium pulcherrimis pennulis cæruleis est amictum. Remiges obscurè virides sunt, quæ se èo usque protendunt, ut caudam quasi ipsæ forment. Femora sunt fusca; ac obscurioribus etiam punctulis notata. Pedes illorumque membranæ ex fusco flavent.

FIGURA III.

A N S E R
H I S P A N I C U S
S E U
C Y G N O I D E S.

Placuit ob magnam conformitatem, quam habet hæc Avis cum Cygnis, Anserem Cygnoidem, illum appellare. Per totum Corpus autem, sibi ferè concolor est; videlicet obscure-auratus; nisi quòd Venter, Gula, ac Pectus, fusco potius rufescenteque colore magis insigniantur. Rostrum (paululum ferratum). Remiges alarum, ac ipsa Cauda, (3 digitos longa) gratè nigrescunt. Quæ ad oras, seu extremitates Remigum insternuntur, 3. 4. lætabili virore splendent. Pedes validi, ac quasi squammosi, griseo colore cinerascunt. Posticus digitus, parvus. Collo decenter erecto incedit hæc Avis, ac indolis mansuetioris quiddam præfert.

III.

ANATINUM

GENUS.

FIGURA I.

TADORN A

BELLONII.

EX WILLUGBEJO.

Vulpanser, & Anas Fera Marina a quibusdam dicitur hæc Avis, quæ magnitudine inter Anserem, & Anatem media est. Rostrum ei breve, latum, nonnihil recurvum, extremitate latiore, colore rubro tinctum, præter nares & ligulam seu unguem extremum, quæ nigra sunt. Ad basin superioris mandibulæ prope caput gibbus, seu tuberculum oblongum carneum. Caput & superior pars colli colore nigricante, seu obscurè viridi, serici instar splendente, qui procul intuentibus niger apparet, tinguntur. Reliquum colli & prolobi regio nivea. Pectus deinde summum, & scapulæ colore pulcherrimo mali aurantii æmulo (qui velut annulus quidam totum corpus anterius ambit) inficiuntur. Pectus, & ventrem medium area nigra ad orificium excrementorum perducta notat. Infra autem sub caudâ idem aurantiæ color sed dilutior. Reliquum pectoris, & ventris, necnon alarum inferior facies alba. Dorsum medium album. Pennæ scapulares dorso utrinque incumbentes nigræ. Alæ pennæ omnes tam remiges, quam vestitrices, præter eas, quæ in extremo intermedio sunt albæ.

FIGURA II.

ANAS FERA
 GRISSEO
 COLORE,
 MENTO CINABRINO,
 UNDULANTI PECTORE.

Quoad staturam non multum differt ab illo Anserino genere ante in medium allato: Coloribus tamen maximè discrepat. Rostrum obscurè miniatum est, ac obtusiori Angulo. Caput a parte superiori pennis virescentibus obtectum gestat, quales ad aliquam etiam colli partem subducuntur. Mentum verò, ac collum planè cinabarinum inspersis maculis albis. Pectoris plumæ visuntur griseæ; undatimque positæ in dorso ab fuscentibus excipiuntur. Venter absque maculis magis simplicis est coloris. Circa Uropygium verò denuo fuscæ aliquæ plumæ se immiscent. Cauda supernè flavescit. Scapulæ mureæ ac lineolis nigris notatae sunt. Remiges ex flavo in fuscum abeunt. Pedes sunt purpurei; digitæ, unæ cum membranâ quasi rubescunt, traductis tamen infuper lineis quoque aliis obscurioribus.

FIGURA III.

A N A S
C R I S T A T A
F L A V E S C E N S.

(AUT ERIT QUERQUEDULA CRISTATA, SIVE COLYMBIS BELLONII; AUT OB SUI NOVITATEM MARSIGLIANA AVIS DICENDA.)

Magnitudinem hujus Avis, Pes unus Romanus emetitur. Rostri, quod pulcherrimè miniatum, compressum attamen valde est, $2\frac{1}{2}$ digitorum probatur mensura. Oculi ex nigro sunt rubescentes, Frons mollibus plumarum Cirris flavis in altum speciosè sustollit, quales etiam ad dimidiā gulam honestè dimituntur: collum verò quod valde gracile est, statim ab occipitio cum pectore ad ventrem usque pennis a fuscedine in cinereum Formam declinantibus protenditur. Dorsum vescitur pennis fuscis dilutioribus; scapulares margines alarum, & ubi tergo hærent, albicantibus nonnullis Plumis renident. Tegetes utrinque verò Remigium, quæ fuscæ sunt, vicissim pennulis quibusdam albis subduntur. Ipsæque Remiges obscure-cinereæ aut quasi cærulecentes fiunt, sicuti & cauda, quæ in fine apicis fuscis insuper quoque notabilem se præbet. Coxas, seu femora, penneæ albicantes obvestiunt. Pedes autem cum membranâ digitos connectente, aspectu amænissimo purpurescunt.

FIGURA IV.

A N A S
 A U R A N T I A
 T U R C I C A
 Q U I B U S D A M D I C T A .

Vulgari Anatum generi, Magnitudine similis; Coloris autem Polydædala varietate perquam dissimilis est. Rostrum, aliquomodo patulum, & aduncum ferratum, ei penitus est nigrum. Vertex cum genis albicat. Totum autem Corpus, alis exceptis atque Penicillo Caudæ, Aurantio Colore, seu subrufo, tinctum est; scapulares pennæ lividescunt. Remiges Alarum, pullo, seu atrato colore sunt. Femora vestiuntur pennulis æquè subrufis. Pedes quoque nigrescunt. Teges verò caudæ grisea est; oculi iridibus albis servant nigredinem.

FIGURA V.

A N A S
 M A R I N A
 PLATYRINCHOS MAS.
 CLANGULA GESNERI.
 Q U A T T R O O C C H I
 I T A L I S.
 EX WILLUGBEJO.

Corpus ei crassum breviusculum. Caput pariter crassum. Collum, ut in hoc genere, breve. Rostrum latum quidem, ut in reliquis hujus generis, at breve, ad caput crassius latiusque, versus apicem angustius, totum nigrum.

Caput colore est perobscurè viridi, splendente tamen ferici instar. Ad angulos oris utrinque macula alba majuscula subrotunda conspicitur, unde nomen Italicum *Quattro Occhi*. Oculorum irides pulcrè flavæ aut croceæ. Collum totum tam primum, quam supinum scapulæ, pectus, & venter totus alba. Inter scapulium, & inferior pars dorsi tota nigricat. Alæ ex albo & nigro variæ sunt. Mediae scilicet pennæ, tum remiges, tum vestitrices albæ; exteriore, interioresque nigræ: ut exactius dicam, Remiges extimæ 14. nigræ proximè septem albæ, intimæ quatuor iterum nigræ. Tegetes septem albarum pariter albæ, exceptis iis, quæ in summâ alâ consistunt. Pennæ scapulares dorso utrinque incumbentes, habent etiam alboris nonnihil admixtum. Cauda penitus nigra est sexdecim pennis composita.

Crura perbrevia crocea, ut & pedes qui grandes sunt. Digi longi circa articulos subnigri, membranæ quoque digitos connectentes obscuræ. Posticus parvus, latâ membranâ auctus. Trachea ad divaricationem labyrintho donatur, & præterea superiùs in ventrem intumescit.

FIGURA VI.

A N A S
 M O S C A T A
 C A I R I N A
 A L D R O V A N D I .

M A S.

EX ALDROVANDO.

Vulgares corporis magnitudine excedunt; mas quoque in hoc genere femellâ major est. Rostrum ei quâ capiti conjungitur valde crassum & tuberosum. Hinc usque ad finem continuè angustius evadit, donec velut in hamum acutum, & curvum desinat. Colore nigricat, nisi prope finem ubi maculam habet rubram, satis amplam, & in principio alteram exiguum ejusdem coloris, sed magis diluti. Caput atrum, & cirratum: guttur statim sub rostro punctulis subcandidis interstinguebatur. Oculos flavos multæ sanguineæ venulæ percurrebant. Totum ferè corpus etiam nigræ, in fine virides, vel saltem, ex nigro virescebant.

In alis quoque, & in caudâ pennas aliquot virescentes cernere erat, item unam aut alteram candidam, quæ ceu maculam albam efformat. Crura valde robusta, seu brevia ad colorem castaneæ proximè accedebant sicut etiam pedes.

FIGURA VII.

A N A S
 M O S C A T A
 C A I R I N A
 A L D R O V A N D I .

F O E M I N A .

E X A L D R O V A N D O .

Foemina hæc Anas mare minor est, & rostro minus tuberoſo, & quæ capiti connectitur lineâ partim albâ, partim rubrâ fatis latâ diſtinguitur. Præterea macula illa, quam in maris roſtro rubram eſſe diximus, in hac eſt cinerei coloris, cui nonnihil rubri eſt admixtum. Cetero ex nigro ad cinereum tendit; ſi duas maculas ſubcandidas demas, quæ medio roſtro ad invicem converſæ literam C. ſingulæ per ſe efformant. Nullos Cirros in capite atros obtinet. Pectus ejusdem quoque coloris, punctis candidis diſtinguitur. Dorſum ut in mare; ſed Alæ multò magis, quæm in illis virescunt, quæ etiam duabus maculis albis notantur. In reliquis parum, aut nihil a mare diſfert.

FIGURA VIII

A N A S
 V I R E S C E N S
 S E U
 C A P I T E
 V I R E S C E N T E.

Non declinat a consuetâ Anatum magnitudine: & Rostrum quod aliquantisper obtusum apparet, flavescit; Nares rubescunt. Vertex, imò potius totus Capitis globus, pennulis subviridibus, serici instar splendentibus vestitur. Collum subrufum, & exile. Pectus medium verò, albo quasi Baltheo circumdatum est. Istudque quantum quantum est, Corpus mirâ varietate ita ludit, ac si tessellatum opus quoddam ibi vel variis instructum floribus pratum cerneret. Dorsum siquidem mureum; Alæ, & potissimum illarum scapula cœrulea; mediâ tamen parte unâ cum remigibus virescente: quæ tamen remiges satis obscuræ sunt, desuperque fusco, plumbeo, tecto obducuntur. Pedes subrufi, cinerea cauda.

FIGURA IX.

A N A S
 F U S C A
 EX WILLUGBEO.

Anati huic, quæ ab aliquibus vulgaris, & media dicitur, Corpus Anseris minus est, Gallinæ ferè par, verum humilius multò, lato dorso, latoque rostro, cruribus brevibus crassis retroversus dispositis, *ut in natatione valentiū instantes Aquas propellere possit pedum palmulis*, ut rectè Aristoteles. Hinc tamen ad gradendum minùs commoda sunt, ut Avis tardè, nec sine difficultate incedat.

Inter marem, & fœminam hoc interest discriminis, quod plumas in uropygio surrectas, & caput versus reflexas habet, hæc minimè. Parit unâ vice duodecim aut quatuordecim, aut etiam plura ova gallinaceis paria, colore albo, lividi tamen viridis, cœruleive tinturâ perfusa, vitello etiam saturatiore, & croceo rubescente.

NIDI ET OVA.

Tom. V.

Q q q

D E

N I D I S E T O V I S

E A R U M.



Um VOLATILIUM unaquæque speciei suæ multiplicandæ, sedulò invigilet, ac commodas sibi Sedes diligere norit, Parturitioni Ovorum, ac Pullitiei confovendæ, naturâ destinas; adultâ, in iis, formâ spectatâ, fœturæ quoque incunabula, investigare atque circa Architectonicam eorum structuram, aliqua in Commentarium referre placuit: cum formâ illorum adspectabili; materiâ de quâ iidem sunt constructi; Germine Ovorum; quibus coloribus, quali Mole, ac quâm numerosum Germen istud esse soleat, in aliquibus, speciebus, distinctim, annotatis.

Ad ea autem Ova, qualia observata habuimus, ante cætera, stat animus primùm exequi. Speciatim verò, sequentia notanda erunt: I. quòd illa cortice consistant, seu Putamine, qui in *Avibus Aquaticis*, nostris *Danubialibus*, pro convenienti plus minùs ratione, durior multò est, quâm in *Terrestribus*. Coloribus ille variis cernitur; candente, cœruleo, luteo, ferè ac ut plurimùm rubro: iidemque sæpiùs cuncti ibidem invicem commixti sunt. Gustus autem illorum, valdè ingratus deprehenditur, quum nimis sit ferinus.

II. Membranis quatuor, Ova sunt dotata; quarum duæ exteriore sunt, quæ albumen exterius succingunt: una interior, quæ vitellum continet: quarta media; quæ interius albumen ambit.

III. Albumine dupli, & distincto membranis propriis, prædicta visuntur: quorum unum tamen tenuius, ac liquidius est altero. Atque observavimus, quòd majori Albuminis copiâ gaudeant *Aves Aquaticæ*, quâm *Terrestres*: & rationem cæteris saniorem, hanc ego judico; quòd quia ex solo Albumine fœtus formatur; longum nihilominus incubationis tempus requiritur, usquedum ad perfectionem, sive exclusionem pervenerit, ob impedimentum humiditatis, seu Frigoris, quod sentiunt in Nidis suis, quos semper, aut in, aut circa Aquas extruunt; at partus sui tutiùs, ac melius Nutrimentum, provida natura, id ideo ita constituerit, illaque præ reliquis, tantâ provisione magis locupletes crearit; usque donec calor formati corporis, de penetralibus majori potentia egressus, ipsum fœtum, ad aëra liberum, quem jam anhelat promoverit. Nihilominus, propter fragilitatem Ovorum, ac varia pericula, quibus eadem semper sunt exposita, Aves cunctæ naturâ id perdoctæ, summâ industriâ sibi domicilium extruere norunt; ubi non solùm se ac corpora sua, sed & modò dicta *Ova* omni securitate fovere possint; immo ubi etiam calor a Matre Ovis impressus, melius conservari valeat: ac domicilium istud, vulgò dicitur **NIDUS**. Pro cuius custodiâ, plerumque Mares, assidere; ac maximâ tum alacritate, custodiam solent exercere, contra hostiles incursus, ac persecutores, *Aves Rapaces*.

CORVI

C O R V I
A Q U A T I C I
N I D U S.

COrvus Aquaticus, ex *Arundine*, & *Straminibus*, plerumque sibi Nidum conficit, inter Ramos Salicum, penes Aquas stagnantes: Figurâ notandâ, Dia-
metro $1\frac{1}{2}$ Ped. mensuram complectentem. Habet ad minimum Ova 4. ad pluri-
mum 6. Colore obscurè Cæruleo; longitud. 6. latitud. autem $3\frac{1}{2}$ digitorum.

ANATUM N I D I.

ANATES tam in Terrâ, quam in Arboribus, atque cavernis, nidificant, ac in potiorem usum ipsis forma rotunda venit. Ova a *Numero Septenario*, ad *Vigesimum* usque nonnunquam excurrunt; Colore diverso; quippe nonnulla albiantia, grisea, & aliqua etiam cœrulea sunt; longitud. 5. latitud. 3*ii*. Digitor.

A V I S
T A R D Æ
N I D U S.

INTER cæteras, particulariter etiam, Avis Tarda, hujusmodi construit. Quæ illum conficit, in Terrâ siccâ; inter procera Gramina, ac altissimas Herbas; quandoque etiam inter Tritici segetes; saepius ex Herbis quoque ipsis, aut arido Fœno $1\frac{1}{2}$ Pedum ut plurimùm longitud. ac latitud. 2. Ei autem, plura Ova non imponit, duobus; quæ longitud. 7. Digitorum latitud. $4\frac{1}{2}$ comprehendunt mensuram. Constant durissimo cortice, variis item coloribus conspicuo; ita tamen, acsi stratum ipsum rubescat. Cui denique variæ Maculæ, albantes, subrufæ, fuscæ, & quasi flavicantes inspersæ sunt.

N I D U S

G R U I S.

Grus quærit pro Nidificatione Insulas, loca humida, & lutoſa: ad ſtruſtum verò adhibet Herbas Aquatiles, ac Straminum Festucas; quibus Nidum ſuum cingit, ac protendit, in longitudine ſimul, ac latitudine $1\frac{1}{2}$ Ped. nec plura Ova, quām duo imponit; quæ ab Anferinis, non multūm diſſimilia funt; excepto, quòd paulò magis ad colorem cæruleum tendant.

CICONIÆ N I D U S.

CIconia amicabiliter quærit degere inter Homines. Nidificat enim, quod pueri sciunt, aut supra Domum, aut in extremitate Turris desertæ cujusquam. Nidum format figurâ rotundâ; magnitudine 2. Pedd. pro materiâ adhibet Virgulta, Herbas, Arundines, spinas: Internè tamen imponit, aut Muscum, aut aliquid hujus simile; extrinsecè, multæ quoque Cavernulæ relinquuntur, in quibus *Passeræ* sibi, atque suis perfugium, ac Tecta quærunt. Ova Ciconiæ ad summum servat 4. Longitud. 5 $\frac{1}{2}$, Latitud. 1 $\frac{1}{2}$. Digitorum, colore albo.

ALBARDEOLÆ

N I D U S.

Albardeola, mirabili artificio nidificat super Arundines conftractas; tantâ altitudine, ut aquæ etiam crescentes, nidum attingere nequeant; formâ rotundâ; Diametro Ped. 1. Mensuram continentem; & quidem ex stramine Levissimo. Imponit Ova 8., Longitud. $4\frac{1}{2}$, & Latitud. $3\frac{1}{2}$. Digitor. Colore virescenti; cui inspersæ sunt egregiæ nonnullæ maculæ purpurascentes, ac luteæ.

ARDEARUM N I D U S.

Ardea, æquali ferè ordine, ac ratione cum Albardeolis nidificat, tam quoad situationem, ac Materiam, quam quoad ejus magnitudinem: Ova in Longitud. 4. & Latitud. 3. Digitor. Mensuram continentia; Colore cæruleo viridi.

PASSERIS
AQUATICI
NIDS.

Passer Aquaticus arte stupendissimâ nidum sibi extruit supra 4. Arundines; quas tenuissimis, villoſis herbulis quibusdam ingenuissimè vincit, ac conneicit: ac eum in tantâ altitudine suspendit, ac format, ut ne aquæ ex crescentes illum unquam attingere valeant. Diametro 4 unciarum demissâ cavitate. Ova 6. ut plurimùm continet, nonnunquam 20. Longitud. $1\frac{1}{2}$ & Latitud. $1\frac{1}{4}$ Digitor. Coloribus variis, viridi nempe, cæruleo, albo ac nigro; cortice tenuissimo; albume copiosissimo: id quod nonnunquam magis, ac ipsum Glutinum coagulari potest.

A N S E R I S
 M A J O R I S
 S Y L V E S T R I S
 N I D U S.

Extruant sibi Nidum Anseres Sylvestres, inter Arundines, Aquis stantes; eâ ratione tamen, ac si intra illas natent; ita ut cum excrecentiâ magis sublimes sint, illâque subsidente, rursus demittantur: ideo firmum fundamentum, seu basin hujusdem faciunt ex stramine, ac Arundinibus. Longitudine 4. Latitud. 3 $\frac{1}{2}$. Pedum Mensuram continentem. 8., ac plus nonnunquam Ova ibi servant, Longitud. 6. Latitud. 4 $\frac{1}{2}$. digitorum, Colore subcinericeo; cortice durissimo.

N I D U S
C Y G N I.

CYgni nidus quoque natans est magnitudine Anseris Sylveticis, nec servat plura quam 7., aut 8. Ova. 6 $\frac{1}{2}$. Latitud., Longitud. 5. Digitor.; colore albo; cortice itidem durissimo.

ONOCROTALI N I D U S.

ONocrotali Nidus, ex cæteris natantibus maximus est, ac positus in aquis brevibus, & parvis, quo nec Homines, nec Aves accessum habere possint. Stramine quidem constructus diametro 6. pedum continet 3. vel 5. Ova; longitud. 9. digitor. latitud. 5 $\frac{1}{2}$. colore virescenti, & cinereo. Pondus ejus est $\frac{20}{21}$. unius libræ. Vitelli color non differt a communi Gallinarum.

COLYMBUS

N I D U S.

COlymbi Nidus totaliter natat, ventisque movetur; straminibus constructus levissimis, Diametro ped. 1. Ova habet vel 10. vel 15., longitud. 4. latitud. 3. digitor. colore rubreflavo; cortice, mediæ tenuitatis.

F U L I C Æ N I D U S.

FUlicæ Nidum $1\frac{1}{2}$ pedum amplitudine, ex stramine constructum, habent. Servant 8. aut 10. Ova; longitud. $4\frac{1}{2}$ digitor. latitud. $3\frac{1}{2}$ cortice tenuissimo, colore albo, cinereo maculisque nigris sparso.

HIRUNDINIS AQUATICÆ NIDUS.

Hirundo Aquatica, multoties sibi Folium Nymphaeæ feligit, super quod straminis festucas quasdam imponit, ut adeò Diameter istius $\frac{1}{2}$ ped. inveniatur. Parit Ova 4. vel 5. longitud. $2\frac{1}{2}$. latitud. 2. digitor. mirifico colore spectanda, luteo siquidem, nigro, viridi, albo. Atque adeò lævis ac politi Marmoris æmula sunt.

VANNELLÆ N I D U S.

VAnnellus luto foramen fodit; & istud cum ramentis straminis integit; quod Nidi vicem obtineat; 3. 4. ped. magnitudine. Servat ad summum, 3. Ova; longitud. 3. latitud. 2. digitor. Quæ nigro-rubicantia sunt; cortice tenuissimo.

N I D I CAVERNALES

QUales Anates, Turcicæ dictæ quibusdam, item Vulpanseres, de cavernis ut pote, ubi Vulpes aliquando habitarunt, & progeniem fecerunt, Nidos sibi confiant, observare datur.

INDEX TOMI QUINTI.

Titulus.
Præfatio.

Pag. 1

■ Tabula Avium Danubialium & Tibiscanarum Aquaticarum. 3

CLASSIS I.

AVES AQUATICÆ, FISSIPEDES.

Descriptio Gruis.

CLASSIS II.

AVES AQUATICÆ, FISSIPEDES, PISCIVORÆ.

Descript. Ardearum.

<i>Tabula 1.</i>	8	<i>Tabula 7.</i>
Ardeæ cinereæ majoris.	<i>Ibid.</i>	Descript. Ardeæ stellaris tertii generis. 18
<i>Tabula 3.</i>	10	<i>Tabula 8.</i>
Ardeæ cinereæ minoris.		Ardeæ cinereæ flavescentis. 20
<i>Tabula 4.</i>	12	<i>Tabula 9.</i>
Ardeæ albæ majoris.		Ardeæ viridè-flavescentis. 22
<i>Tabula 5.</i>	14	<i>Tabula 10.</i>
Ardeæ albæ minoris.		Ardeæ fuscaæ. 24
<i>Tabula 6.</i>	16	<i>Tabula 11.</i>
Ardeæ Stellaris.		Ciconiæ. 26

<i>Tabula 7.</i>	8	<i>Tabula 12.</i>
Descript. Ardeæ stellaris tertii generis.		Plateæ, seu, Pelicani. 28
<i>Tabula 8.</i>		
Ardeæ cinereæ flavescentis.		
<i>Tabula 9.</i>		
Ardeæ viridè-flavescentis.		
<i>Tabula 10.</i>		
Ardeæ fuscaæ.		
<i>Tabula 11.</i>		
Ciconiæ.		
<i>Tabula 12.</i>		
Plateæ, seu, Pelicani.		

CLASSIS III.

AVES AQUATICÆ, LIMOSUGÆ, ROSTRIS TENUIBUS,
LONGISSIMIS, RECTIS.

Descript. Gallinaginis cinereæ, majoris, Maris.

<i>Tabula 13.</i>	30	<i>Tabula 15.</i>
Descript. Gallinaginis cinereæ, majoris, Maris.		Descript. Gallinaginis vulgaris, minoris. 34

<i>Tabula 15.</i>	34
Descript. Gallinaginis vulgaris, minoris.	

Tabula 16.

Barge, seu, Ægocephali.

36

CLASSIS IV.

AVES AQUATICÆ, LIMOSUGÆ, ROSTRIS TENUIBUS,
LONGISSIMIS, CURVIS.

Descript. Numenii, sive, Arcuatæ.

<i>Tabula 17.</i>	38	<i>Tabula 19.</i>
Descript. Numenii, sive, Arcuatæ.		Descript. Falcinelli, colore furvo.

Tabula 19.

Descript. Falcinelli, colore furvo.

Tabula 20.

Falcinelli, puniceo-viridis.

I i i

Tom. V.

40

INDEX TOMI QUINTI

C L A S S I S V.

AVES AQUATICÆ, NON PISCIVORÆ, ROSTRIS TENUIBUS, MEDIÆ LONGITUDINIS.

D	<i>Tabula 21.</i>		<i>Tabula 23.</i>	
Escript.	Himantopi.	46	Descript. Gallinulæ, seu, Crythropi majoris.	50
<i>Tabula 22.</i>			<i>Tabula 24.</i>	
	Pluvialis majoris.	48	Avis pugnacis.	52

C L A S S I S VI.

AVES AQUATICÆ, ROSTRIS TENUIBUS, INSECTIVORÆ.

D	<i>Tabula 25.</i>		Descript. Pluvialis flavo-virescentis, Fœminæ.	60
Escript.	Pluvialis viridis, seu, Pardalis.	54	<i>Tabula 26.</i>	
<i>Tabula 26.</i>			Pluvialis fusco-cinereæ.	62
	Pluvialis cinereæ, seu, Squatarolæ.	56	<i>Tabula 27.</i>	
<i>Tabula 27.</i>			Pluvialis flavo-cinereæ.	64
	Pluvialis flavo-virescentis, Maris.	58	<i>Tabula 28.</i>	
<i>Tabula 28.</i>			Pluvialis minoris.	66

C L A S S I S VII.

AVES AQUIS INNATANTES, FISSIPEDES.

D	<i>Tabula 32.</i>		Descript. Fulicæ.	70
Escript.	Gallinulæ Chloropii.	68	<i>Tabula 34.</i>	
<i>Tabula 33.</i>			Recurvi-Rostræ.	72

C L A S S I S VIII.

AVES PALMIPEDES, TETRADACTILÆ.

D	<i>Tabula 35.</i>		<i>Tabula 36.</i>	
Escript.	Onocrotali, seu, Pelicani.	74	Descript. Corvi Aquatici.	76

C L A S S I S IX.

AVES ROSTRO ANGUSTO, IN EXTREMO ADUNCO, SERRATO: MERSI DICTÆ.

D	<i>Tabula 37.</i>		<i>Tabula 42.</i>	
Escript.	Merganferis.	78	Descrip. Lari albicantis.	88
<i>Tabula 38.</i>			<i>Tabula 43.</i>	
	Colymbi majoris, Cristati.	80	Lari cinerei, minoris.	90
<i>Tabula 39.</i>			<i>Tabula 44.</i>	
	Colymbi, sive, Podicipis minoris.	82	Lari cinerei, Fissipedis.	92
<i>Tabula 40.</i>			<i>Tabula 45.</i>	
	Lari cinerei, maximi.	84	Lari maculati.	94
<i>Tabula 41.</i>			<i>Tabula 46.</i>	
	Lari cinerei, majoris.	86	Hirundinis ripariae.	96

CLAS-

INDEX TOMI QUINTI.

C L A S S I S X.

AVES PALMIPEDES LATIROSTRÆ.

D escript. Cygni mansueti.	98	Descript. Anatis Cristatae, flavescentis.	110
<i>Tabula.</i> 47.		<i>Tabula.</i> 54.	
Cygni feri.	<i>Ibid.</i>	Anatis Aurantiæ, Turcicæ.	112
<i>Tabula.</i> 48.	100	<i>Tabula.</i> 55.	
Anseris feri, Fœminæ.		Anatis marinæ, Maris.	114
<i>Tabula.</i> 49.	102	<i>Tabula.</i> 56.	
Anserini alterius generis.		Anatis moscatæ, Maris.	116
<i>Tabula.</i> 50.	104	<i>Tabula.</i> 57.	
Anseris Hispanici, seu, Cygnoidis.		Anatis moscatæ, Fœminæ.	118
<i>Tabula.</i> 51.	106	<i>Tabula.</i> 58.	
Tadornæ.		Anatis virescens.	120
<i>Tabula.</i> 52.	108	<i>Tabula.</i> 59.	
Anatis feræ, griseo colore.		Anatis fusca.	122
<i>Tabula.</i> 53.			

DE NIDIS ET OVIS AVIUM.

D E Nidis & Ovis.	124	<i>Tabula.</i> 67.	
Descript. Nidi Corvi Aquatici.	126	Descript. Nidi Anseris majoris, sylvestris.	142
<i>Tabula.</i> 60.		<i>Tabula.</i> 68.	
Nidi Anatum.	128	Nidi Cygni.	144
<i>Tabula.</i> 61.		<i>Tabula.</i> 69.	
Nidi Avis Tardæ.	130	Nidi Onocrotali.	146
<i>Tabula.</i> 62.		<i>Tabula.</i> 70.	
Nidi Gruis.	132	Nidi Colymbi.	148
<i>Tabula.</i> 63.		<i>Tabula.</i> 71.	
Nidi Ciconiaæ.	134	Nidi Fulicæ.	150
<i>Tabula.</i> 64.		<i>Tabula.</i> 72.	
Nidi Albardeolæ.	136	Nidi Hirundinis Aquaticæ.	152
<i>Tabula.</i> 65.		<i>Tabula.</i> 73.	
Nidi Ardearum.	138	Nidi Vannellæ.	154
<i>Tabula.</i> 66.		<i>Tabula.</i> 74.	
Nidi Passeris Aquatici.	140	Nidorum cavernarium.	Ibid.

INDEX FIGURARUM

In unâquâque Tabulâ

TOMI QUINTI.

IN CLASSE I.

AVIUM AQUATICARUM, FISSIPEDUM.

Grus, *Tabula 1.*
Γέρανος Græcis.

IN CLASSE II.

AVIUM AQUATICARUM, FISSIPEDUM, PISCIVORARUM.

Ardea cinerea, *Tabula 2.*
major.
Tabula 3.
Ardea cinerea, minor.
Tabula 4.
Ardea alba, major.
Tabula 5.
Ardea alba, minor.
Tabula 6.
Ardea stellaris.
Tabula 7.
Ardea stellaris: tertium genus.

Tabula 8.
Ardea cinerea, flavescens.
Tabula 9.
Ardea viridè-flavescens.
Tabula 10.
Ardea fusca.
Tabula 11.
Ciconia.
Tabula 12.
Platea; sive, Pelicanus Aldrovandi; Leucorodius, si-
ve, Albardeola Willugbei.

IN CLASSE III.

AVIUM AQUATICARUM, LIMOSUGARUM, ROSTRIS
TENUIBUS, LONGISSIMIS RECTIS.

Gallinago major, *Tabula 13.*
cinerea, Mas.
Tabula 14.
Gallinago major, cinerea, Foemina.
Tabula 15.

Gallinago vulgaris, minor.
Tabula 16.
Barge; seu, Ægocephalus Bellonii; Fedoa Gesneri;
Rusticula Aldrovandi. Scolopace major.

INDEX FIGURARUM TOMI QUINTI.

IN CLASSE IV.

AVIUM AQUATICARUM, LIMOSUGARUM, ROSTRIS
TENUIBUS, LONGISSIMIS, CURVIS.

Numenius, sive, Arcuata, colore atro-cinereo.
Tabula 17.
Arcuata minor, puniceo colore, pectore virescente.
Tabula 18.

Falcinellus Gesneri & Aldrovandi, colore furvo.
Tabula 19.
Falcinellus, puniceo-viridis, Ardeæ specie.
Tabula 20.

IN CLASSE V.

AVIUM AQUATICARUM, NON PISCIVORARUM, ROSTRIS TENUIBUS, MEDIAE LONGITUDINIS.

HImanthopus Plinii.
Tabula 21.
Pluvialis major Aldrovando, Glottis Baltuero, Venetis Totano.
Tabula 22.

Gallinula, Erythropus major Gesneri.
Tabula 23.
Avis pugnax.
Tabula 24.

IN CLASSE VI.

AVIUM AQUATICARUM, ROSTRIS TENUIBUS,
INSECTIVORARUM.

Pluvialis viridis, seu, Pardalis.
Tabula 25.
Pluvialis cinerea.
Tabula 26.
Pluvialis flavo-virescens, Mas.
Tabula 27.
Pluvialis flavo-virescens.
Tabula 28.

Pluvialis flavo-virescens, Fœmina.
Tabula 29.
Pluvialis fusco-cinerea.
Tabula 30.
Pluvialis flavo-cinerea.
Tabula 31.
Pluvialis minor.

IN CLASSE VII.

AVIUM AQUIS INNATANTIAM, FISSIPEDUM.

GAllinula Chloropus.
Tabula 32.
Recurvi-Rostra.
Tabula 33.

Fulica.
Tabula 34.

IN CLASSE VIII.

AVIUM PALMIPEDUM, TETRADACTYLARUM.

ONocrotalus, seu, Pelicanus Aldrovandi & Wil-
lugbei.
Tabula 35.

Corvus Aquaticus.
Tabula 36.

INDEX FIGURARUM TOMI QUINTI.

IN CLASSE IX.

AVIUM ROSTRO ANGUSTO, IN EXTREMO ADUNCO, SERRATO.

M erganfer.	<i>Tabula</i> 37.
	<i>Tabula</i> 38.
Colymbus major, Cristatus.	
	<i>Tabula</i> 39.
Colymbus minor.	
	<i>Tabula</i> 40.
Larus cinereus, maximus.	
	<i>Tabula</i> 41.
Larus cinereus, major.	

	<i>Tabula</i> 42.
Larus albicans.	
	<i>Tabula</i> 43.
Larus cinereus, minor.	
	<i>Tabula</i> 44.
Larus cinereus, Fissipes.	
	<i>Tabula</i> 45.
Larus maculatus.	
	<i>Tabula</i> 46.
Hirundinis ripariae species.	

IN CLASSE X.

AVIUM PALMIPEDUM, LATIROSTRARUM.

C Ygnus.	<i>Tabula</i> 47.
	<i>Tabula</i> 48.
Anser ferus.	
	<i>Tabula</i> 49.
Anserinum genus aliud.	
	<i>Tabula</i> 50.
Anser Hispanicus, seu, Cygnoides.	
	<i>Tabula</i> 51.
Tadorna.	
	<i>Tabula</i> 52.
Anas fera, griseo colore.	
	<i>Tabula</i> 53.

Anas cristata, flavescentia.	<i>Tabula</i> 54.
Anas Aurantia.	
	<i>Tabula</i> 55.
Anas Platyrinchos.	
	<i>Tabula</i> 56.
Anas moscata, Mas.	
	<i>Tabula</i> 57.
Anas moscata, Femina.	
	<i>Tabula</i> 58.
Anas virescens.	
	<i>Tabula</i> 59.
Anas fusca.	

NIDI ET OVA AVIUM.

C orvi Aquatici Nidus.	<i>Tabula</i> 60.
	<i>Tabula</i> 61.
Anatum Nidi.	
	<i>Tabula</i> 62.
Avis Tardæ Nidus.	
	<i>Tabula</i> 63.
Gruis Nidus.	
	<i>Tabula</i> 64.
Ciconiæ Nidus.	
	<i>Tabula</i> 65.
Albardeolæ Nidus.	
	<i>Tabula</i> 66.
Ardearum Nidus.	
	<i>Tabula</i> 67.

Passeris Aquatici Nidus.	<i>Tabula</i> 68.
Anseris majoris, sylvestris Nidus.	
	<i>Tabula</i> 69.
Nidus Cygni.	
	<i>Tabula</i> 70.
Onocrotali Nidus.	
	<i>Tabula</i> 71.
Colymbi Nidus.	
	<i>Tabula</i> 72.
Fulicæ Nidus.	
	<i>Tabula</i> 73.
Hirundinis Aquaticaæ Nidus.	
	<i>Tabula</i> 74.
Vannellæ Nidus.	

F I N I S.

GRVS

Tom. V. Tab. 1.





ARDEA CINEREA
Major.

ARDEA CINEREA.
Mincr.



ARDEA ALBA
Major.



ARDEA ALBA
Minor.




ARDEA STELLARIS
Willughb.






ARDEA STELLARIS.
Tertium Genus.



ARDEA CINEREA
Flavescens.

ARDEA VIRIDE-FLA.
VESCENTS.





ARDEA FVSCA

CICONIA



PLATEA seu PELICANUS
Aldrovandi

Leucorodius seu ALBA
ARDEOLA Willughby.





GALLINAGO MAJOR
CINEREA *Mas.*



GALLINAGO MAJOR
CINEREA, *Tocima*.



GALLINAGO VULGAR.
Minor.

Barge,
S.
ÆGOCEPHALUS *Bellonij*
FEDOA, Gesneri.
RUSTICOLA *Aldrovandi*
Scolopace *Major.*





NUMENIUS sive ARCUATA,
Colore Atro-Cinereus.



ARCUATA Minor
Numenius Colore, Petore
Tirescente.



FALCINELLVS
Gesneri, Aldrov.
Cicire Cfurvo.



FALCINELLVS
Ruineo-Iridis;
ARDEA Specie.

HIMANTOPVS
Plinij.





Rivialis Major,
Aldrovando.
Locrys, Baltnero.
Tenuis, Totano.




GALLINULA ERYTHRO-
PUS, Major, Gesneri.



Avis Pugnax



PLUVIALIS Viridis;
Pardalis ^{secu}.



PLUVIALIS
Cinerrea.



PLUVIALIS Flavo-
Virescens; *C. Mas.*




PLUVIALIS Flavo-
Virescens; *Fœmina*.



PLUVIALIS FUSCO-CINEREA.



PLUVIALIS FLAVO-CINEREA.




PLUVIALIS Minor.

GALLINULA Chloropus.





FULICA.



Recurvirostra.



ONOCROTALUS, sive *Rilla-*
canus, Aldrov. *Willughb.*

Pl. 246.



CORVUS AQUATICUS.



MERGANSER

COLYMBUS Major;
Cristatus.



COLYMBUS Minor.





LARUS Cinereus Maximus
Marinarius Piscator



LARUS Major; Ciureus:
Bellonii.
Hirundo Marina; *Gularis* *Piscarius*;
Gyr-Falco Marinus; *Aliquid* *Dictus*.




LARVS Albicans.



LARUS Cinerous
Minor.

LARVS Cinereus, *Tiſipes*
Roſtro & Pedib. Rubeis.






LARUS MACCULATUS.



Hirundinis Riparia
Species.

CYGNVS





ANSER FERRVS.
XIV AYSCO, SCULPS.



Anserinum Genus
Aliud
Xerophylogeese Garſt

Anser Hispanicus
Seu
Cygnoides.





TADORNA *Bellonii*.



ANAS Tera; Griseo Colore.
Mento Ruffo; Undulanti
Pectore.



ANAS Cristata; *Tlavescens*
Querquedula *Cristata*
Clynnis ^{sive} *Bellonij.*



ANAS Aurantia.



ANAS PLATYRYNCHOS
Mas.
Clangula, Gesneri. Quattro-
Oechi, Ital. Italis.



ANAS MOSCHATA
Cairina
Aldrov. Mus.



ANAS MOSCHATA
Cairina
Aldrov. Fennia

ANAS Virescens.







ANAS Fusca.

CORVI AQVATICI NIDVS.

Tom.V Tab.60.



A N A T V M N I D I .




A V I S T A R D Æ N I D V S .



GRVIS NIDVS.




CICONIÆ NIDVS.



ALBARDEOLÆ NIDVS.



ARDEARVM NIDVS.



PASSERIS AQUATICI NIDVS.



ANSER. MAIOR. SYLVESTR. NIDVS.



NIDVS CYGNI.




O NOCROTALI NIDVS.

C O L Y M B I N I D V S .



FVLICÆ NIDVS.



HIRVNDINIS A Q V A T I C Æ N I D V S .



VAN ELLÆ NIDVS.

